Bei Tierarztproben:
Adresse des Tierhalters: .....

Auftraggeber:

Kopie an Berater: ....

Kopie an Tierarzt: ....

Probenentnahmedatum: ....

Tel./Natel: ....

E-Mail: ....

Kuhmilch – *Staphylokokkus aureus GTB* (Genotyp_B) und **spp.** (Spezies)

5 – 10 mL Kuh-Milch in Proberöhre (ohne Konservierungsmittel)
Hoftank/Mischmilchprobe / Bestandeskontrolle: Rührwerk vor Probenahme ≥ 1 Minute einschalten
Einzeltierprobe: Immer Gesamtgemelk 4/4, sauber ab Euter fassen
Einzeltierprobe: Keine Tiere während Behandlung und 20 Tage nach Sperrfrist beproben (Antibiotika/Penicillin)
Probe zum Mischen/Poolen: Probe wird im Labor gemischt und analysiert, wenn positiv →
Einzeltierkontrolle **Staph. aureus Paket (GTB + spp.): Die Probe wird sowohl auf den Mastitiserreger Staph. aureus spp. wie auch auf den ansteckenden Staph. aureus GTB zum Vorzugstarif untersucht.**

	Zuordnung	**Nr. / Name / Bezeichnung**	Staph. aureus Paket	Staph. aureus GTB	Staph. aureus spp.	Zellzahl
1	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
2	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
3	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
4	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
5	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
6	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
7	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
8	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
9	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
10	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
11	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
12	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
13	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
14	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
15	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
16	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
17	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
18	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
19	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					
20	☐ Hoftank/Mischmilch ☐ Kuh (4/4) ☐ Probe zum Mischen/Poolen					

Mit der Verwendung dieses Formulars stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu.

Datum: …… Unterschrift:……

Merkblatt zur korrekten Probefassung für Staphylokokkus aureus GTB

Hoftankmilch

Tankmilch gut aufrühren (Rührwerk ≥ 1 Minute einschalten)

Probe oben aus Tank entnehmen: 8 – 10 ml in steriles Mastitis-Proberöhrchen

➔ Sind alle laktierenden Kühe im Tank?
- o Von Kühen, deren Milch nicht abgeliefert wird: Mischmilchprobe (4/4) separat beproben.

➔ Bei Nachweis von Staph. aureus GTB aus Tankmilch
- o Kühe (4/4) einzeln untersuchen oder
- o Poolen (Mehrere Tiere in einer Probe)

Proben sauber ab Strich (4/4) fassen

Erste 2 bis 3 Strahlen Milch in Schalmtestschale/Vormelkbecher melken !
Zweck: Der Strichkanal wird ausgespült und die Milch für die Probe stammt aus der Euterzisterne.

- **Vor jeder Probenentnahme**; mit **sauber gewaschenen Händen** oder **frischen Einweghandschuhen** die **Zitzenspitzen** mit **Euterreinigungstuch reinigen** (Vermeidung von Kontamination über Hände/Handschuhe von vorher beprobter Kuh).
- Mit kräftigem Milchstrahl aus jedem Viertel des Euters **Röhrchen 3/4 bis maximal 1 cm unter Rand füllen.**
- Bei der Probenerhebung mit der nächststehenden Zitze beginnen und mit der entferntesten Zitze enden. Darauf achten, dass vom Haarkleid des Tieres kein Staub in das Proberöhrchen /-Deckel fällt.

Poolproben

Die Einzeltierproben werden im Labor aus den Einzeltierproben gepoolt.
So muss die saubere Probenentnahme ab Euter (4/4) im Stall nur einmal erfolgen.

Tiere mit Mastitis

➔ Schalm-Test-positive Kühe auch auf Mastitis (alle Erreger / Plattenmethode) untersuchen lassen

➔ Vorteilhaft Antibiogramm durchführen

➔ Behandelte Tiere nachkontrollieren. Frühestens 7 Tage nach Absetzfrist Probe fassen

Galtkühe

➔ Gezielt ergalten lassen. Bei einer Infektion, zuerst therapieren (nach vorgehendem Milchuntersuch) und mit Euterschutz trocken stellen

➔ Nach dem Abkalben beproben, sofern die Tiere nicht vor dem Galtstellen in der Hoftankmilch beprobt wurden. (frühestens 10 Tage nach dem Abkalben)

Zukauf von Kühen während Laktation oder Galtkühe

➔ Nur Schalmtest-negative Kühe zukaufen

➔ Alle zugekauften Tiere unbedingt beproben, damit eine Neuansteckung verhindert werden kann

➔ Zugekaufte Tiere am Schluss melken bis Resultat vorliegt

Proberöhrchen fest verschliessen, gut kühlen und möglichst schnell weiterleiten:
- zusammen mit Begleit- / Adresszettel direkt ins Labor bringen
- oder Nachmittags, kurz vor Postschalterschluss mit A-Post senden an:

BAMOS AG, Neue Industriestrasse 63, 9602 Bazenheid