

## Euter gesund halten

Probleme mit der Eutergesundheit und hohen Zellzahlen gehören zu den häufigsten Abgangsgründen für Milchkühe. Durch schonendes (geringe mechanische Belastung des Euters), zügiges und hygienisches (möglichst wenig Krankheitserreger übertragen) melken kann die Eutergesundheit nachhaltig verbessert werden.

### Voraussetzungen

Sauberer, tierliebender, ruhiger und interessierter Melker. Gut funktionierende, gewartete und saubere Melkmaschine. Gute Melkbereitschaft der Kuh.

### Die Melkreihenfolge

Um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden, sind Kühe mit Euterentzündungen unbedingt am Schluss zu melken. Die Milch solcher Kühe ist nicht verkehrstauglich und darf nicht abgeliefert werden. Um eine gute Melkreihenfolge einhalten zu können, muss die Eutergesundheit regelmässig überprüft werden:

- Milchkontrolle im Vormelkbecher
- Euterkontrolle mit Schalmtest
- Monatliche Zellzahluntersuche beim Zuchtverband
- Laboruntersuchungen (Mastitisiagnostik, Antibiogramm)

### Vorbereitung der Kuh zum Melken

1. Vormelken von 2-3 Milchstrahlen in den Vormelkbecher. **Nicht auf das Läger vormelken.** Zitzen nicht mit Milch befeuchten.
2. Zitzen reinigen mit geeignetem **Einweg-Material:** Feuchtpapier, Reinigungsschaum, Holzwolle der Euterlappen.
3. Melkzeug erst bei Milcheinschuss ansetzen. Bis zur Wirkung des Oxytocins vergehen bei einigen Kühen bis zu eineinhalb Minuten. Vormelken und Zitzenreinigung genügen, um die Oxytocin-ausschüttung anzuregen, ein Massieren oder «Handeln» ist in dieser Zeit nicht nötig.

### Das Melken

4. Die Kuh nicht melkbereit warten lassen. Melkzeug sofort ansetzen, sobald die Milch einschiesst. **Lufteinsaugen vermeiden** (Rückspray). Vor dem Weggehen den vollen Milchfluss abwarten.
5. Maschine in richtiger Position melken lassen, auf Milchfluss achten.
6. Am Ende des Milchflusses: Euter und **Ausmelkgrad kontrollieren.** Sofern nötig, kurz mit der Maschine nachmelken, durch sorgfältiges Belasten des Sammelstückes (Luftleinbrüche vermeiden).
7. Melkzeug korrekt abnehmen, sobald keine Milch mehr fließt
  - 7.1. Vakuum unterbrechen / Milchabsperrhahn schliessen
  - 7.2. sanfter Zug und warten bis die Melkbecher loslassen ⇒ nie Luft einlassen an einem Melkbecher (Rückspray)
  - 7.3. Melkbecher in die Hand gleiten lassen / Milchreste kurz absaugen
8. Zitzen direkt nach dem Melken mit einem **Zitzendesinfektionsmittel tauchen** oder spraysen.

